

شروع با قرص ۱۲.۵/۵۰ روزی یک بار، افزایش با نصف قرص هر ۱-۳ روز به ۲۵/۱۰۰ ۳ بار در روز. مصرف روزانه ۳۰۰-۲۰۰۰ میلی گرم ۳ بار در روز عوارض جانبی: مشابه بالا

COMT Inhibitor Entacapone (Comtan®)

شروع با ۲۰۰ میلی گرم با هر قرص لودپا، حد اکثر ۶۰۰ میلی گرم روزانه

عوارض جانبی: زردی/نارنجی شدن ادرار، اسهال، تشدید عوارض جانبی داروی لودپا

نکات مهم درباره مصرف داروهایتان

دارو باید هر روز سر موقع و به مقدار تجویز شده مصرف شود.

در باره تاثیر و عوارض دارو از متخصص خود سوال کنید.

شما باید همیشه به یک داروخانه مراجعه کنید چون آنها رکورد داروهای مصرفی شما را دارند و مطمئن میشوند که داروهایی که مصرف می‌کنید باهم تداخل نداشته باشند.

همیشه یک لیوان پر آب با هر قرص بنوشید.

از جویدن دارو خودداری کنید



DID YOU KNOW?

Millions of Parkinson's patients suffering from poverty around the world

- Cannot afford to buy their medications
- Cannot afford to purchase a cane, walker, or a wheelchair
- Cannot obtain educational literature about Parkinson's in their language
- Are not able to afford consulting a neurologist and remain undiagnosed and untreated

OUR SERVICES

We provide unique services for Parkinson's patients including:

- Parkinson's medications to those patients who can't afford to buy them
- Canes, walkers & wheelchairs to prevent falls
- Parkinson's educational brochures in 15 languages
- Free electronic educational newsletter
- Free Parkinson's clinics
- Chapters of World Parkinson's Program & Parkinson's Education Clubs in various parts of the world

JOIN THE FIGHT AGAINST PARKINSON'S

TO DONATE, VISIT PDPROGRAM.ORG

اطلاعات این بروشور فقط برای هدف‌های آموزشی ساخته شده است، و جایگزین مشاوره دکتر متخصص شما نمی‌باشد.

Acknowledgments: Dr. A. Q. RANA Neurologist (Canada)

سوالات متداول در مورد

بیماری پارکینسون

دارو و درمان

Parkinson's Disease – Treatment



PERSIAN - 2



www.pdprogram.org

کسانی که با آگاهی با بیماری پارکینسون دست و پنجه نرم میکنند همیشه رامحلی پیدا میکنند. - دکتر عبد القیوم رانا

درمان پارکینسون چیست؟

متأسفانه بیماری پارکینسون علاج ندارد، ولی درمان‌های زیادی برای بهبود عوارض این بیماری در دسترس است. دارو درمانی مهمترین اینهاست. فیزیوتراپی، گفتار درمانی از دیگر درمان‌ها هستند که میتوانند به بیمار کمک کنند. جراحی میتواند برای برخی از بیماران مفید واقع شود.

به چه درمانی احتیاج دارید؟

درمان بیماری پارکینسون برای هر بیماری میتواند متفاوت باشد. بست به نوع عوارض، زمان شروع بیماری، طرف درگیر بدن (چپ یا راست)، و سن بیمار، نوع درمان میتواند تغییر کند. بیمارانی که بازنشسته هستند میتوانند دیرتر شروع به استفاده از دارو برای کنترل عوارض این بیماری شوند، اما این در مورد بیمارانی که کار میکنند صدق نمیکند. همچنین نوع درمان میتواند بسته به نوع شغل بیمار تغییر و یا تنظیم شود. معمولاً مصرف دارو موقعی تجویز میشود که مریض دیگر قدرت ادامه دادن به زندگی روزمره خود نمی‌باشد.

مهم است که بدانید این داروها باعث کاهش و یا جلوگیری سرعت پیشرفت بیماری نمیشوند. همچنین این داروها عوارض جانبی خود را دارند. در نتیجه مصرف دارو، و مقدار داروی مصرفی فقط و فقط بعد از مشورت با پزشک متخصص خود باید انجام شود.

چه داروهایی برای درمان پارکینسون به کار گرفته میشوند؟

Amantadine (Symmetrel®)

شروع ۱۰۰ میلی گرم ۳ بار در روز
عوارض جانبی: ورم پا، توهمات بصری، کهیر دست یا پا

Anticholinergics

Trihexyphenidyl (Artane®)

شروع ۱ میلی گرم روزی یک بار، به آرامی افزایش داده میشود به ۲ میلی گرم ۳ بار در روز، حداکثر ۵ میلی گرم ۳ بار در روز
عوارض جانبی: خشکی دهان، اختلال ادراری، بیوست، توهمات بصری، گیجی

MAOB Inhibitors

Rasagiline (azilect®)

شروع ۵/۰ میلی گرم روزی یک بار، به آرامی افزایش داده میشود به ۱ میلی گرم در روز
عوارض جانبی: مشکلات مفصلی، علائم سرما خوردگی، تشدید عوارض جانبی داروی لودپا

Selegeline (Eldepryl®)

شروع ۵ میلی گرم روزی یک بار، به آرامی افزایش داده میشود به ۵ میلی گرم دوبار در روز. مصرف آخرین قرص در بعد از ظهر
عوارض جانبی: بیخوابی اگر در عصر یا شب مصرف شود، تشدید عوارض جانبی داروی لودپا

Dopamine Agonists

Pramipexole (Mirapex®)

شروع ۱۲۵/۰ میلی گرم روزی سه بار در، به آرامی افزایش داده میشود به صورت هفتگی به ۵/۱ میلی گرم سه‌بار در روز

عوارض جانبی: خواب آلودگی در طول روز، اختلالات رفتاری، میل جنسی بیش از حد، ورم پا، توهمات بصری

Ropinirole (Requip®)

شروع ۲۵/۰ میلی گرم، ۳ بار در روز، افزایش هفتگی به هدیکسرا ۸ میلی گرم ۳ بار در روز
عوارض جانبی: مشابه داروی بالا

Levodopa

Levodopa/Carbidopa (Sinemet®)

شروع با نصف قرص ۲۵/۱۰۰ روزی یک بار، افزایش با نصف قرص هر ۱-۳ روز. مصرف روزانه ۳۰۰-۲۰۰۰ میلی گرم ۳ بار در روز
عوارض جانبی: سرگیجه، تهوع، خواب دیدن، خواب آلودگی

Levodopa/Carbidopa controlled-released (Sinemet CR®)

قرص ۲۵/۱۰۰ یا ۵۰/۲۰۰
عوارض جانبی: مشابه بالا

Levodopa/bensarazide (Prolopa®)